



⑫

Gebrauchsmuster

U 1

- (11) Rollennummer G 82 22 426.9
- (51) Hauptklasse G02C 7/02
- (22) Anmeldetag 07.08.82
- (47) Eintragungstag 20.01.83
- (43) Bekanntmachung
im Patentblatt 03.03.83
- (54) Bezeichnung des Gegenstandes
Brillenlinse für stark Fehlsichtige
- (71) Name und Wohnsitz des Inhabers
Fa. Carl Zeiss, 7920 Heidenheim, DE

G 6253
3.82

10.12.82

17

- 2 -

Brillenlinse für stark Fehlsichtige

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Brillenlinse für stark Fehlsichtige. Unter starker Fehlsichtigkeit ist dabei der Bereich oberhalb 5 +6 dpt und unterhalb -6 dpt verstanden.

Brillenlinsen in den genannten Bereichen weisen bei sphärischer Ausbildung beider Linsenflächen schwerwiegende Nachteile auf, die vor allem darin liegen, daß Linsen im Minusbereich hohe Randdicken und Linsen im Plusbereich hohe Mittendicken erhalten. Abgesehen vom hohen Gewicht der Brillenlinsen führt dies auch zu optischen Fehlern. Bei Pluslinsen können im Randbereich bestimmte Objektbereiche überhaupt nicht gesehen werden; bei Minuslinsen werden im Randbereich bestimmte Objektbereiche doppelt gesehen. Dazu kommen schon bei kleinen Blickwinkeln große Abbildungsfehler, insbesondere Astigmatismus und Einstellfehler.

Ausgehend von der Erkenntnis daß es bei herkömmlichen Brillenlinsen mit starker dioptrischer Wirkung wegen der auftretenden Abbildungsfehler ohnehin nicht möglich ist den gesamten Linsenbereich zum Sehen zu verwenden ist es bekannt die störenden Linsendicken dadurch zu reduzieren, daß man den optisch nutzbaren Durchmesser verkleinert und die Linse mit einem Tragrand versieht. Dieser liefert dann den Gesamtdurchmesser der Linse und wird in die Brillenfassung eingeschliffen. Bei dieser Ausführung treten die erwähnten optischen Unstetigkeiten schon bei kleineren Blickwinkeln auf und die Brillenlinse vermag ästhetisch nicht zu befriedigen. Dasselbe gilt auch für die sogenannten Lentikularlinsen, bei denen die Dicke außerhalb des optisch nutzbaren Durchmessers nicht in Form einer Stufe sondern nach einem Flächenknick kontinuierlich zum Linsenrand hin abfällt.

30

Es hat nicht an Versuchen gefehlt Brillenlinsen für stark Fehlsichtige für den Benutzer komfortabler und ästhetisch befriedigender zu gestalten.

35 So ist es aus der DE-OS 29 41 733 bekannt Brillenlinsen im Plusbereich mit einer konvexen rotationssymmetrischen asphärischen Vorderfläche und einer konkaven sphärischen bzw. torischen augenseitigen Fläche auszubil-

0222406

10.12.82

73

- 3 -

den. Man erhält damit eine Linse, bei der die Vorderfläche außerhalb des gut korrigierten optisch nutzbaren Durchmessers stetig in den Tragraud übergeht. Bei solchen Linsen ist die Vorderfläche im Mittelteil stark konvex gekrümmt und biegt zum Rand hin in einen konkaven Bereich um. Da
5 sich die Linse damit auch weit aus der Fassung vorwölbt, werden solche Brillenlinsen als ästhetisch nicht befriedigend empfunden.

Aus der DE-OS 29 42 216 ist es bekannt Brillenlinsen im Minusbereich mit einer rotationssymmetrischen asphärischen Vorderfläche und einer konkaven
10 sphärischen bzw. torischen augenseitigen Fläche auszubilden. Auch bei dieser Linse geht die Vorderfläche außerhalb des gut korrigierten nutzbaren Durchmessers stetig in den Tragraud über. Die Vorderfläche ist zumindest im korrigierten Bereich konkav, während ihr Randbereich konvex ist, so daß eine solche Linse ästhetisch keinesfalls befriedigt. Außer-
15 dem wirken diese Linsen wegen ihres relativ großen Abstandes zur Hornhaut des Auges stark verkleinernd.

Schließlich sind seit kurzem Brillenlinsen im Minusbereich im Handel, bei denen auf der augenseitigen Fläche einer üblichen, mit sphärischen
20 Flächen ausgebildeten meniskusförmigen Minuslinse ein Lentikularausschliff vorgenommen ist, dessen Durchmesser je nach Korrektur 20 - 40 mm beträgt und der sphärisch ist. Der Rand des Lentikularausschliffes geht stetig in den Außenbereich der Trägerlinse über.

25 Eine solche Linse bietet bei höheren Wirkungen nur ein kleines Blickfeld, in dem infolge der sphärischen Ausbildung des zentralen Teils die Bildfehler nicht optimal korrigiert sind.

Es ist nun die Aufgabe der vorliegenden Erfindung eine Brillenlinse für
30 stark Fehlsichtige zu schaffen, deren Aussehen bei annehmbarer Dicke der Linse ästhetisch voll befriedigt, bei der die Bildfehler in einem genügend großen Bereich optimal korrigiert sind, bei der keine störenden Unstetigkeiten der Sehfelder auftreten und bei der die Gesamtvergrößerung möglichst nahe bei 1 liegt.

35

Diese Aufgabe wird durch eine gemäß dem kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 ausgebildeten Brillenlinse gelöst.

000000

10.12.82

- 4 -

Bei der Brillenlinse nach der Erfindung ist die objektseitige Vorderfläche konvex ausgebildet. Sie bietet damit dem Betrachter die Ansicht, die er von üblichen Brillenlinsen her gewohnt ist. Da zugleich die asphärisch ausgebildete augenseitige Linsenfläche keine Unstetigkeiten und Knicke aufweist, ist die Brillenlinse ästhetisch voll befriedigend.

Die ästhetisch befriedigende Ausbildung der Brillenlinse bedingt, daß zumindest bei höheren astigmatistischen Wirkungen der wesentliche Anteil dieses Augenfehlers durch einen Torus auf der augenseitigen Fläche der Linse behoben wird. Zur Korrektur der auftretenden Bildfehler, wie Astigmatismus und Einstellfehler muß diese Fläche atorisch ausgebildet werden, wie es beispielsweise in der DE-OS 30 16 936 beschrieben ist. Ein solcher Atorus erfordert einen höheren Fertigungsaufwand als eine rotationssymmetrische Asphäre; er ermöglicht aber auch eine optimale Korrektur der Bildfehler. Um die Zahl der verschiedenen atorischen Flächen einer Linsenserie in vertretbaren Grenzen halten zu können, ist es denkbar anstelle der normalerweise sphärischen Vorderfläche eine schwach torische Fläche anzubringen.

Bei der neuen Brillenlinse ist also ganz bewußt ein höherer Fertigungsaufwand in Kauf genommen um die Brillenlinse ästhetisch voll befriedigend zu gestalten und um in jedem Falle eine optimale Korrektur der Bildfehler zu erhalten.

Bei den erwähnten asphärisch korrigierten Brillenlinsen ist die Vorderfläche als Asphäre ausgebildet. Damit wird es möglich auf verhältnismäßig billige Weise die Rückfläche als Torus auszubilden, wenn die Brillenlinse eine astigmatistische Wirkung haben soll.

Damit wird zwar erreicht, daß die Rückfläche im Vergleich zur asphärisch ausgebildeten Vorderfläche keine hohen Fertigungskosten verursacht, doch muß dies damit erkaufte werden, daß die durch die Vorderfläche erreichte gute Korrektur durch die torische Rückfläche wieder verschlechtert wird. Entsprechendes gilt für Brillenlinsen ohne asphärische Korrektur.

35

Im Gegensatz dazu dient bei der Brillenlinse nach der Erfindung nur eine Fläche, nämlich die asphärisch oder atorisch ausgebildete Rückfläche,

822426

10.12.82

- 5 -

zur optimalen Korrektur der Bildfehler, wobei die ästhetisch befriedigende Wirkung der Brillenlinse in jedem Falle erhalten bleibt.

Bei der Brillenlinse nach der Erfindung kann die asphärische Ausbildung
5 der Rückfläche mit dem Ziel erfolgen, den Astigmatismus zu Null zu machen. Ein dabei verbleibender kleiner Einstellfehler kann durch Akkommodation ausgeglichen werden. Bei Pluslinsen für Aphake ist dies natürlich nicht mehr sinnvoll, so daß hier die Korrektur mit dem Ziel geführt wird, den Astigmatismus sowie den Einstellfehler möglichst klein zu
10 halten. Bei den herkömmlichen Asphären bedeutet dies, daß der Tangentialfehler zu Null gemacht wird.

Das Hauptblickfeld umfaßt den Blickwinkel bis zu einem Wert von etwa 20°. Bei der Brillenlinse nach der Erfindung wird im Minusbereich der
15 optisch nutzbare Durchmesser so groß gemacht, daß ein objektseitiger Blickwinkel von 30° gewährleistet ist. Im Plusbereich wird der optisch nutzbare Durchmesser so gewählt, daß ein objektseitiger Blickwinkel von ca. 20° gewährleistet ist.

20 Von diesem Durchmesser aus geht die augenseitige Fläche zweimal stetig differenzierbar in einen Bereich über in dem ihre meridionale Steigung sich der Steigung der konvexen Vorderfläche annähert. Annähern bedeutet in diesem Zusammenhang, daß der Unterschied der Steigungen nicht größer ist als bei sphärisch ausgebildeten Linsen schwacher Wirkung. Durch
25 diese Maßnahme wird die prismatische Wirkung sehr klein gehalten und der Gesichtsfeldausfall, bzw. der sogenannte Bildsprung stark reduziert oder sogar zu Null gemacht.

Wird die Fehlsichtigkeit eines Auges mittels einer Brillenlinse korri-
30 giert, so hat das System Brillenlinse/Auge eine gewisse Gesamtvergrößerung, die bewirkt, daß der Brillenträger insbes. mit Brillenlinsen höherer dioptrischer Wirkung Gegenstände im Sehfeld nicht in ihrer natürlichen Größe wahrnimmt. Diese Gesamtvergrößerung V errechnet sich nach folgender Formel:

35

$$V = \frac{1}{1-e \cdot S'} \times \frac{1}{1-\frac{d}{n} \cdot D_1} \quad (1)$$

000000

10.12.82

7 A

- 6 -

Dabei bedeuten:

e^* = Abstand des Brillenlinsenscheitels vom vorderen Hauptpunkt des Auges

S' = dioptrische Wirkung der Brillenlinse, in dpt

5 d = Mittendicke der Brillenlinse

n = Brechungsindex des Brillenlinsen-Materials

$D_1 = \frac{n - 1}{r_1}$

r_1 = Radius der objektseitigen Fläche der Brillenlinse

10 Der erste Faktor dieser Gleichung wird als Systemvergrößerung, der zweite als Eigenvergrößerung bezeichnet.

Mit Hilfe der Brillenlinse nach der Erfindung gelingt es auch stark
fehltsichtige Augen zu korrigieren und zugleich den Nachteil der verän-
15 derten Größenwahrnehmung gegenüber bisher bekannten Brillenlinsen zu
reduzieren.

Im Minusbereich kann durch die geringe Randdicke der Brillenlinse der
Abstand e^* klein gehalten werden, so daß die Gesamtvergrößerung V näher
20 bei 1 gehalten werden kann als bei bekannten Brillenlinsen.

Im Plusbereich ermöglicht es die Erfindung die Mittendicke d zu redu-
zieren und die Durchbiegung D_1 der Frontfläche klein zu halten. Damit
wird es auch in diesem Bereich möglich die Gesamtvergrößerung V näher
25 bei 1 zu halten als bei bekannten Brillenlinsen.

Wird die neue Brillenlinse als Pluslinse ausgebildet, so ist es, insbe-
sondere bei höheren dioptrischen Wirkungen vorteilhaft zur optimalen
Reduktion der Dicke und damit der Gesamtvergrößerung V der augenseitigen
30 asphärischen Rückfläche in ihrem korrigierten Bereich eine konvexe Ge-
stalt zu geben. Der Meridianschnitt einer solchen Linse hat dann augen-
seitig die Form eines doppelten flachen S. Wenn man den optisch nutz-
baren Durchmesser etwas weiter reduziert, beispielsweise auf einen Wert
von 35 mm, so erhält man eine Brillenlinse, die sehr viel dünner und
35 deshalb auch leichter ist als bekannte vergleichbare Brillenlinsen.

Die Erfindung wird im folgenden anhand der Fig. 1-7 der beigegeführten

8222426

10.12.83

22

- 7 -

Zeichnungen näher erläutert. Im einzelnen zeigen:

Fig. 1a eine Brillenlinse mit der dioptrischen Wirkung -14 dpt in der Ausbildung als Lentikularlinse;

5 Fig. 1b eine Brillenlinse derselben dioptrischen Wirkung in der Ausbildung nach DE-OS 29 42 216;

Fig. 2 ein Ausführungsbeispiel einer nach der Erfindung ausgebildeten Brillenlinse mit -14 dpt;

10

Fig. 3a eine Brillenlinse mit der dioptrischen Wirkung +18 dpt in der Ausbildung als Tragrandlinse;

15

Fig. 3b eine Brillenlinse derselben dioptrischen Wirkung in der Ausbildung nach DE-OS 29 41 733;

Fig. 4 ein Ausführungsbeispiel einer nach der Erfindung ausgebildeten Brillenlinse mit +18 dpt;

20 Fig. 5 ein anderes Ausführungsbeispiel einer nach der Erfindung ausgebildeten Brillenlinse mit +18 dpt;

Fig. 6 eine Brillenlinse mit der dioptrischen Wirkung +6 dpt in der Ausbildung nach DE-OS 29 41 733;

25

Fig. 7 ein Ausführungsbeispiel einer nach der Erfindung ausgebildeten Brillenlinse mit +6 dpt, die aus dem gleichen Material ist wie die Brillenlinse der Fig. 6

30 Die in Fig. 1a dargestellte bekannte Brillenlinse 1 ist zur Reduzierung der Randdicke mit einem Lentikularschliff 2 versehen. Die Flächen 3 und 4 sind sphärisch ausgebildet. Wie ohne weiteres einzusehen ist, genügt eine solche Linse ästhetischen Anforderungen nicht; sie zeigt für den Betrachter den sogenannten "Flaschenbodeneffekt".

35

Bei der in Fig. 1b dargestellten bekannten Brillenlinse 5 ist die augenseitige Fläche 3 sphärisch ausgebildet, während die objektseitige

8222426U1

10.12.82

33

- 8 -

Vorderfläche 4 die Form einer rotationssymmetrischen Asphäre hat. Der optisch-nutzbare Durchmesser ist mit 6 bezeichnet. Innerhalb dieses Bereiches ist die Brillenlinse korrigiert, außerhalb davon geht sie in einem optisch nicht korrigierten Bereich stetig in den Tragrund 7 über.

5

Auch diese Linse vermag ästhetisch nicht zu befriedigen, da die im Mittelbereich hohle und am Rand wulstförmige Vorderfläche 4 als störend empfunden wird.

10 Bei der nach der Erfindung ausgebildeten Brillenlinse 8 der Fig. 3 ist die Vorderfläche 4 als Sphäre, die augenseitige Fläche 3 dagegen als Asphäre ausgebildet. Innerhalb des Durchmessers 6 liegt der optisch nutzbare Bereich innerhalb dessen die Bildfehler optimal korrigiert sind. Eine solche optimale Korrektur läßt sich mittels der Fläche 3 in
15 jedem Falle erreichen, insbesondere auch dann wenn die Linse eine astigmatistische Wirkung haben soll.

Die Fläche 3 im optisch-nutzbaren Bereich 6 kann eine rotationssymmetrische Asphäre sein, wenn die Brillenlinse keine astigmatistische Wirkung
20 haben soll. In diesem Fall verläuft der Bereich 9 über den gesamten Durchmesser symmetrisch zum Tragrund hin. Soll die Brillenlinse eine astigmatistische Wirkung haben, so ist die Fläche 3 als Atorus ausgebildet. Auch dann ist es möglich den Tragrund über den gesamten Umfang gleich dick zu halten und den scharfabbildenden Bereich 6 kreisförmig zu ge-
25 stalten, indem der Bereich 9 unsymmetrisch ausgebildet wird.

Wie ein Vergleich der Fig. 2 mit Fig. 1b zeigt, läßt sich die gemäß der Erfindung ausgebildete Brillenlinse 8 näher an das Auge des Benutzers bringen als die bekannte Linse 5, so daß der Wert e^* kleiner wird und
30 damit die Systemvergrößerung und auch die Gesamtvergrößerung V näher an 1 herangeführt wird.

Bei der in Fig. 3a dargestellten bekannten Brillenlinse 10 aus dem Plusbereich ist außerhalb des optisch-nutzbaren Durchmessers 6 ein verhältnismäßig dünner Tragrund 11 vorgesehen. Die Flächen 3 und 4 sind sphärisch ausgebildet. Es ist ohne weiteres einzusehen, daß eine solche
35 Brillenlinse ästhetischen und optischen Anforderungen nicht genügt.

0000400

10.12.82

- 9 -

Bei der in Fig. 3b dargestellten Brillenlinse 12 ist die Rückfläche 3 sphärisch ausgebildet, während die Vorderfläche 4 die Gestalt einer Asphäre hat. Außerhalb des optisch nutzbaren Durchmessers 6 geht die Vorderfläche stetig in den Rand 13 über, wobei die Krümmung der Fläche 4 wechselt; die im Mittelbereich stark konvex gekrümmte Fläche 4 verläuft in ihrem äußeren Bereich konkav gekrümmt. Dies ist der Grund, weshalb auch eine solche Linse ästhetisch nicht befriedigt.

Die in Fig. 4 dargestellte, gemäß der Erfindung ausgebildete Brillenlinse 14 hat dieselbe dioptrische Wirkung und ist aus dem gleichen Material (Allyldiglycolcarbonat CR 39) hergestellt wie die bekannte Brillenlinse der Fig. 3b. Beide Linsenflächen 3 und 4 haben im Bereich des optisch-nutzbaren Durchmessers 6 eine konvexe Gestalt, d.h. die Linse ist biförmig. Die Vorderfläche 4 ist konvex sphärisch, die Rückfläche 3 ist asphärisch mit konvexem Verlauf im Bereich des Durchmessers 6 und konkavem Verlauf im Bereich 15. In diesem Bereich nähert sich die meridionale Steigung der Rückfläche 3 der Steigung der sphärischen Vorderfläche 4, wobei dieser Übergang stetig ist. Die Rückfläche 3 ist zweimal stetig differenzierbar. Ihr Meridianschnitt hat die Form eines doppelten flachen S.

Wie ein Vergleich der Fig. 3a, 3b mit Fig. 4 zeigt ist bei der Biform die Frontfläche 4 wesentlicher flacher gestaltet als bei den anderen Brillenlinsen. Eine solche flache Frontfläche bringt den Vorteil mit sich, daß die Vorwölbung gegen die Brillenfassung gering ist, so daß eine solche Brille für einen Betrachter einen angenehmen Anblick bietet.

Außerdem kann bei der Brillenlinse der Fig. 4 die Mittendicke geringer gehalten werden kann, als bei bekannten Formen, so daß die Linse leichter wird. Gegenüber der Brillenlinse der Fig. 3b ergibt sich eine Gewichtseinsparung von ca. 10%.

Die verringerte Mittendicke und die flachere Ausbildung der Frontlinse bringt entsprechend der Formel (1) den Vorteil, daß bei der Biform der Fig. 4 die Eigenvergrößerung und damit die Gesamtvergrößerung V gegenüber bekannten Formen deutlich reduziert ist. Dies bringt dem Benutzer einen ganz wesentlichen Vorteil, der sich zudem auch in ästhetischer

0000400

10.12.82

35

- 10 -

Hinsicht bemerkbar macht.

Eine weitere deutliche Reduzierung der Mittendicke und der Frontlinsendurchbiegung ergibt sich bei einer Ausbildung der Brillenlinse aus Silikatglas, beispielsweise aus dem von der Firma SCHOTT unter der Bezeichnung BaSF 64 vertriebenen Glas. Eine aus diesem Glas hergestellte Brillenlinse 16 zeigt Fig. 5. Auch hier hat die Rückfläche 3 in ihrem zentralen Teil 6 eine konvexe Gestalt, die im Bereich 17 in einen konkaven Verlauf übergeht.

10

In der nachfolgenden Tabelle sind für Pluslinsen einer dioptrischer Wirkung von +18 dpt einige Daten der nach der Erfindung ausgebildeten biförmigen Brillenlinse den Daten einer bekannten Brillenlinse nach Fig. 3b gegenübergestellt.

15

	Bekannte Linse (Fig. 3b)	Biform (Fig. 4)	Biform (Fig. 5)
Material	CR 39 $n=1.501$	CR 39 $n=1.501$	Silikotglas $n=1.706$
Außendurchmesser	67	66	66
Mittendicke d	13.6	12.3	8.6
25 Radius der Vorderfläche r_1	29.70	43.74	61.39
Radius der Rückfläche r_2	268.27	-94.81	-121.89
Eigenvergrößerung	1.18	1.10	1.06
Systemvergrößerung	1.35	1.35	1.35
Gesamtvergrößerung V	1.60	1.49	1.43

30

Alle Maße sind in mm angegeben. Die Radien r_1 und r_2 sind bei asphärischer Ausbildung der betreffenden Fläche jeweils die Krümmungsradien in der Linsenmitte.

35 Eine Brillenlinse-Serie muß einen sehr großen Bereich dioptrischer Wirkungen umfassen, der auch das einleitend definierte Gebiet der starken Fehlsichtigkeit einschließt.

0022406

10.12.82

26

- 11 -

Für dioptrische Wirkungen, die außerhalb des Gebietes der starken Fehlsichtigkeit liegen, werden Brillenlinsen üblicherweise meniskenförmig ausgebildet, d.h. mit konvexer Vorderfläche und konkaver Rückfläche.

- 5 Würden die Pluslinsen im gesamten Gebiet starker Fehlsichtigkeit als Biformen entsprechend den Fig. 4 und 5 ausgebildet, so könnte der Fall eintreten, daß ein Patient, dessen Augen verschieden hyperop sind zur Korrektur seiner Fehlsichtigkeit eine Brille hätte, deren eine Linse meniskusförmig ist, während die andere eine Biform aufweist. Eine solche
- 10 Brille würde ästhetisch nicht befriedigen, da die Biform vorderseitig weniger stark gekrümmt ist als die meniskusförmige Linse.

- Aus diesem Grunde ist es vorteilhaft im Anfangsbereich des Gebietes starker Fehlsichtigkeit auch meniskusförmige Brillenlinsen vorzusehen.
- 15 Diese Linsen sind gemäß der Erfindung ausgebildet, d.h. ihre Rückfläche ist asphärisch. Mit Hilfe von asphärischen bzw. atorischen Flächen gelingt die Korrektur der Bildfehler bei jeder Durchbiegung der Fläche, so daß sowohl eine meniskusförmige als auch eine biförmige Gestalt der Brillenlinse möglich ist, ohne daß sich diese Formen hinsichtlich der
- 20 Korrektur der Bildfehler unterscheiden.

Ein Ausführungsbeispiel einer gemäß der Erfindung ausgebildeten meniskusförmigen Brillenlinse mit der dioptrischen Wirkung von +6 dpt ist in Fig. 7 dargestellt.

- 25 Eine Brillenlinse derselben dioptrischen Wirkung in der Ausbildung nach DE-OS 29 41 733 zeigt Fig. 6. Diese Linse 18 weist eine Vorderfläche 4 auf, die in ihrem mittleren Bereich stärker durchgebogen ist als die Vorderfläche der Linse 20 in Fig. 7. Außerdem wechselt die Krümmung der
- 30 bekannten Linse 18 beim Übergang vom mittleren Bereich 6 in den äußeren Bereich 19. Bei der Linse 20 in Fig. 7 ist die Rückfläche 3 im Bereich des Randes 21 stärker gekrümmt als im Mittelbereich 6; hier nähert sich die Steigung der Rückfläche 3 der Steigung der Vorderfläche 4 an.

- 35 Da bei der Linse nach Fig. 7 die Vorderfläche 4 flacher und damit der Wert D_1 kleiner ist, ist die Gesamtvergrößerung V kleiner als bei der bekannten Linse nach Fig. 6.

000000

10.12.82

27

- 12 -

Wie eine Betrachtung der Fig. 2,4,5 und 7 zeigt ist bei allen Brillen-
linsen in der erfindungsgemäßen Ausbildung die Krümmung der Rückfläche 3
außerhalb des optische nutzbaren Mittelbereichs 6 relativ stark. Dies
reduziert den sogenannten "Rückspiegeleffekt", d.h. die den Brillenträ-
5 ger störende Sichtbarkeit der sich an der Rückfläche spiegelnden Objekte
starker Helligkeit. Solche störenden Spiegeleffekte treten dagegen, wie
die Figuren 1 und 3 zeigen bei den bekannten Brillenlinsen auf.

Auch diese Eigenschaft der neuen Brillenlinsen erhöht also ihren Trage-
10 komfort.

15

20

25

30

35

8222426

10.12.82

- 13 -

Zusammenfassung:

Brillenlinse für stark Fehlsichtige

5 Brillenlinse für stark Fehlsichtige mit einer konvex ausgebildeten objektseitigen Vorderfläche (4) und einer augenseitigen Fläche (3), die in einem mittleren Bereich (6), der mindestens das Hauptblickfeld umfaßt asphärisch korrigiert ist. Von diesem Bereich geht die augenseitige Fläche (3) in einen Bereich über, in dem ihre meridionale Steigung sich
10 der Steigung der konvexen Vorderfläche (4) annähert. Die gesamte augenseitige Fläche (3) der Brillenlinse ist zweimal stetig differenzierbar.

Eine solche Brillenlinse hat ein ästhetisch voll befriedigendes Aussehen und ermöglicht es die Gesamtvergrößerung des Systems Auge/Brillenlinse
15 näher bei 1 zu halten als bekannte Brillenlinsen. Die Bildfehler sind in einem genügend großen Bereich optimal korrigiert und es treten keine störenden Unstetigkeiten der Sehfelder auf.

20

25

30

35

WSh/Mtz
050882

02.04.83

10.12.82

16

- 1 -

Patentansprüche

1. Brillenlinse für stark Fehlsichtige, dadurch gekennzeichnet, daß die objektseitige Vorderfläche (4) konvex ausgebildet ist und daß die
5 augenseitige Fläche (3) in einem mittleren Bereich (6) der mindestens das Hauptblickfeld umfaßt asphärisch korrigiert ist und von dort in einen Bereich übergeht in dem ihre meridionale Steigung sich der Steigung der konvexen Vorderfläche (4) annähert, wobei die gesamte augenseitige Fläche zweimal stetig differenzierbar ist.
- 10 2. Brillenlinse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorderfläche (4) konvex sphärisch ausgebildet ist.
3. Brillenlinse nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die
15 augenseitige Fläche (3) bis zu einem Blickwinkel von etwa 30° asphärisch korrigiert ist.
4. Brillenlinse nach Anspruch 1-3, dadurch gekennzeichnet, daß der asphärisch korrigierte Teil der Innenfläche (3) als rotationssymmetrische Asphäre ausgebildet ist.
20
5. Brillenlinse nach Anspruch 1-3, dadurch gekennzeichnet, daß der asphärisch korrigierte Teil der Innenfläche (3) als Atorus ausgebildet ist.
- 25 6. Brillenlinse nach Anspruch 1-5 mit stark positiver Wirkung, dadurch gekennzeichnet, daß die augenseitige Innenfläche (3) in ihrem korrigierten Bereich (6) eine konvexe Gestalt hat (Fig. 5).
- 30 7. Brillenlinse nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß ihr Meridianschnitt augenseitig die Form eines doppelten flachen S hat (Fig. 5).

35

822426

10.12.82

39




Fig. 1a




Fig. 1b




Fig. 2

8.22.85

10-12-82

40




Fig. 3a




Fig. 3b




Fig. 4




Fig. 5

10-12-82

U1A




Fig. 6




Fig. 7

1019 / 82

81-7-426

1P 966

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record.

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☒ **BLACK BORDERS**

☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**

☐ **FADED TEXT OR DRAWING**

☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**

☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**

☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**

☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**

☒ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**

☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**

☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.